

Supastock®

Bột sữa cho đàn giống



**Dưỡng chất đầy đủ
Con giống chất lượng**



Facebook
Tôm Cá khỏe
cùng MSD




Zalo
Cá khỏe
cùng MSD



MSD AH LP
(Android & IOS)








NHU CẦU THỨC ĂN TỰ NHIÊN


- Cá bột mới nở có kích thước rất nhỏ.
- Cá bột sẽ bắt đầu sử dụng thức ăn sau 24 - 48 tiếng sau khi nở.
- Hệ thống tiêu hóa phát triển chưa hoàn thiện, chúng cần thức ăn kích thước nhỏ, chứa đầy đủ men tiêu hóa, khoáng và chất dinh dưỡng.

VAI TRÒ QUAN TRỌNG THỨC ĂN TỰ NHIÊN

- Kích thước nhỏ**
 - Vi tảo (2-20 μm) cho động vật hai mảnh vỏ, tôm, luân trùng, copepod; luân trùng (50-200 μm) cho giáp xác, cá; ấu trùng Artemia, Moina (400-800 μm) cho giáp xác, cá
 - Trứng nước cho proteinase, peptidase, lipase, cellulase
- Có giá trị dinh dưỡng cao**
 - Protein (>40%)
 - Acid béo cao phân tử không no (HUFA)
 - Các vitamin và khoáng vi lượng
- Cung cấp các enzyme tiêu hoá**




Kích cỡ miệng cá tra bột trong 10 ngày đầu từ 0.44 – 1.4mm nên yêu cầu thức ăn kích thước 0.15 – 0.42 mm




Sau khi tiêu hết noãn hoàn cá ăn chủ yếu luân trùng trong 2 ngày tiếp theo, sau đó thức ăn ưu tiên được chuyển dần đến trứng nước.

THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM GÂY NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN BẰNG SUPASTOCK® TRONG ƯƠNG CÁ TRA BỘT, THÔNG QUA THÀNH PHẦN PHIÊU SINH ĐỘNG VẬT TRONG AO NUÔI.


Ao đánh Supastock® trước 4 ngày



Ao đánh Supastock® trước 2 ngày



Ao không sử dụng Supastock®



- Nguyên sinh động vật
- Bo bo, trứng nước
- Giáp xác chân chèo
- Luân trùng

Ao nuôi sử dụng Supastock® trước 2 ngày khi thả bột và liên tục 10 ngày tiếp theo, cho tỉ lệ luân trùng, trứng nước cao, đồng thời tăng trưởng của cá trong 10 ngày đầu thả cũng tốt nhất.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Hai tuần đầu: 1-3kg/ 1,000 m³/ngày, hòa nước tạt đều ao.
- Tuần thứ ba đến thu hoạch: 1kg/ 20kg thức ăn (1kg/ 200-500kg cá).

Trước khi thả cá 1 ngày	Sau khi thả cá															
	Ngày															
Supastock® 1 kg/1.000 m ³	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Supastock® (kg/1.000 m ³)	1	1	1,5	2	3	3	2	2	1	0,5						
Supastock® (g/kg thức ăn)											50	50	50	50	50	50

Supastock® thay thế hoàn toàn cho bột đậu nành, lòng đỏ trứng

Tài liệu tham khảo:
 Hoa AV. 2018. Gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao ương cá tra. TCKH Đại học Cần Thơ 153
 Liem PT. 2020. Ảnh hưởng của mật độ và kích thước phiêu sinh vật lên tỉ lệ sống cá tra. TCKH Đại học Cần Thơ 12